

## **INDE – De l'arachide plutôt que du coton**

Par Christophe NOISETTE

Publié le 05/08/2003

Suite aux échecs des cultures de coton, les surfaces consacrées à ces dernières ont diminué de 25% au profit des cultures d'arachide, dans les états de Saurashtra et Kutch. Outre la déception sur les rendements des cultures de coton, il est à noter que les cultures d'arachide nécessitent environ deux fois moins d'eau. Ce renversement inclut les cultures de coton transgénique.

« Durant les deux dernières années, j'ai essayé plusieurs variétés de coton Bt mais toutes ont échoué », explique J. Balda<sup>1</sup>, producteur de la région de Rajkot. Des essais en champs conduits dans les régions du Maharashtra et de l'Andhra Pradesh ont montré que les bénéfices nets tirés des cultures de coton Bt étaient plus faibles que ceux tirés de cultures de coton conventionnel. Près de 60% des agriculteurs ayant cultivé du coton Bt n'ont pu rentrer dans leur frais et ont même subi des pertes sèches évaluées à 1,5 euros par hectare<sup>2</sup>.

---

---

Adresse de cet article : [https://infogm.org/article\\_journal/inde-de-larachide-plutot-que-du-coton/](https://infogm.org/article_journal/inde-de-larachide-plutot-que-du-coton/)